


ก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์ม

- จัดเตรียมโรงเรือนที่สะอาดและมีระบบ Biosecurity ที่ดี



- กระจายวัสดุรองพื้นอย่างสม่ำเสมอ ความหนา 2-5 ซม. (0.8-2 นิ้ว)
- เลือกใช้อาหารเม็ดบีดี้ที่ร่อนแล้วหรือมีฝุ่นน้อย หรือใช้ Mini pellet ขนาด 2 มม.
- โรยอาหารบนกระดาดชปูกก ปริมาณ 40 กรัม ต่อ ลูกไก่ 1 ตัว

- อุณหภูมิโรงเรือนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนที่ลูกไก่เดินทางมาถึงฟาร์ม
- อุณหภูมิภายในกก (ณ ระดับความสูงของลูกไก่)
 - ระบบกกทั้งโรงเรือน: 30°C/86°F
 - ระบบหัวกก
 - 32°C/89.6°F ที่ขอบหัวกก
 - 29°C/84.2°F ที่ระยะ 2 เมตร (6 ฟุต) จากขอบหัวกก
- อุณหภูมิวัสดุรองพื้น: 28-32°C/82.4-89.6°F
- อุณหภูมิพื้นโรงเรือน: 28-30°C / 82.4-86.0°F
- ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 60-70%
- ความเร็วลม < 0.15 เมตร/วินาที (30 ฟุต/นาที่)
- จัดวางอุปกรณ์ภายในกกให้เป็นระเบียบ และไม่กีดขวางการเข้าถึงอาหารและน้ำของลูกไก่
- จัดวางอุปกรณ์ให้น้ำเสริมใกล้กับอุปกรณ์ให้อาหารอัตโนมัติ



เมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม

- ส่มชั่งน้ำหนักลูกไก่ (3 กล่อง หรือ 1% ของโรงเรือน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) บันทึกน้ำหนักเฉลี่ย และ CV% / ค่ายูนิฟอร์ม



- ส่มเช็คอุณหภูมิฆวรของลูกไก่ (39.4-40.5°C / 103-105°F)



- ปล่อยลูกไกลงบนกระดาดชปูกก อย่างรวดเร็ว นุ่มนวล และกระจายให้ทั่ว



- ตรวจสอบว่ามีอาหารและน้ำให้ลูกไกกินอย่างเพียงพอ
- ความเข้มแสงควรอยู่ที่ 30-40 ลักซ์ (2.8-3.7 ฟุตเทียน)



หลังปล่อยลูกไกลงเลี้ยง

- ตรวจสอบพฤติกรรมของลูกไก่หลังจากผ่านไป 1-2 ชั่วโมง
- ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามพฤติกรรมของลูกไก่



ลูกไกรู้สึกหิว



ลูกไกรู้สึกสบาย



ลูกไกรู้สึกร้อน

- จำเป็นต้องมีการระบายอากาศชั้นต่ำ (โดยไม่ให้เกิดกระแสลมแรง) เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์และกำจัดก๊าซเสีย ความชื้นส่วนเกิน และความร้อน
- ให้อาหารปริมาณน้อยแต่เติมบ่อยครั้ง
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ให้น้ำ น้ำในอุปกรณ์ให้น้ำเสริมสะอาดและสดใหม่
- ตรวจสอบกระเพาะพักลูกไก่

เวลา หลังจาก ปล่อยลูกไกลงกก	2 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
เป้าหมาย (% ลูกไกรู้สึกหิวและ น้ำเต็มกระเพาะพัก)	75	80	>80	>85	>95